


Herramientas **breves de evaluación clínica.**





Desde los 17 años.




Permite evaluar una amplia gama de síntomas psicopatológicos en menos de 15 minutos.

Evalúa nueve dimensiones sintomáticas (Somatización, Obsesión-compulsión, Sensibilidad interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad fóbica, Ideación paranoide y Psicoticismo) y tres índices globales de malestar.



De 12 a 15 min.

Ampliar información



Desde los 18 años.



Cribado del distrés psicológico y síntomas psiquiátricos. Elevada sensibilidad en solo 4 minutos.

Instrumento eficaz y fácil de aplicar, para apoyar la toma de decisiones clínicas y evaluar el progreso a lo largo de un tratamiento.

Uso recomendado en oncología y atención primaria.



4 min. aprox.

Ampliar información




BDI-II

Inventario de depresión de Beck



Desde los 17 años.



Evaluación breve de la existencia y severidad de síntomas depresivos.

Líder mundial para la evaluación de la depresión en adultos. Adaptado por primera vez a la población española con una muestra de más de 2.000 individuos.



De 5 a 10 min.

Ampliar información



BDI-FastScreen

Inventario de depresión de Beck para pacientes médicos



Desde los 16 años.



Instrumento para detectar y evaluar la gravedad de los síntomas depresivos en pacientes médicos.

Desarrollado de forma específica para evaluar los síntomas de depresión en pacientes que informan de síntomas somáticos y conductuales, que pueden atribuirse a otros trastornos o enfermedades médicas.



Menos de 5 min.

Ampliar información






Inventario de ansiedad de Beck



Desde los 17 años



Evaluación breve de la existencia y severidad de síntomas de ansiedad.

Discrimina entre grupos de pacientes con y sin trastorno de ansiedad en diferentes poblaciones clínicas.

En combinación con el BDI-II, permite evaluar la elevada comorbilidad entre los síntomas de ansiedad y depresión.



De 5 a 10 min.

[**Ampliar información**](#)



BYI-2

Inventarios de Beck
para niños y adolescentes-2



De 7 a 18:11 años.



Conjunto de medidas integradas para una evaluación completa del malestar psicológico de niños y adolescentes.

Cinco inventarios autoaplicados breves para evaluar depresión, ansiedad, ira, conducta disruptiva y autoconcepto.



Entre 5 y 10 min.
por inventario

[**Ampliar información**](#)



Asesoramiento técnico *online*



¿Necesita asesoramiento sobre nuestros tests de evaluación clínica?

Nuestro equipo de **psicólogos** técnicos especialistas se pone a su disposición.

Estaremos **encantados de atenderle** y resolver todas sus dudas.

» [Reserve su cita *online*](#)



Contacte con nosotros:



+34 913 828 300/66



clinicalcomercial@pearson.com



Cumplimentando el [formulario de contacto](#) en nuestra página web.

Suscríbese a nuestra Newsletter

Manténgase informado de nuestras noticias, ofertas y promociones.



Síguenos y participe en nuestras conversaciones:

