



# MCM - IV

INVENTARIO CLÍNICO  
MULTIAXIAL DE MILLON-IV

## MCM-IV

Inventario clínico multiaxial de Millon-IV

Informe

*Theodore Millon, PhD, DSc*

---

Nombre:	Caso Muestra MCM-IV
Edad:	53
Sexo:	Varón
Situación actual:	Paciente ambulatorio con hospitalización previa
Nivel educativo:	Educación secundaria
Estado civil:	Divorciado
Fecha de aplicación:	26/06/2018

Copyright © 2015 DICANDRIEN, Inc. Copyright de la adaptación española © 2018 DICANDRIEN, Inc. Todos los derechos reservados. Adaptación española realizada y distribuida por Pearson Educación, S.A., Ribera del Loira, 28, 1.º, Madrid 28042, con la autorización de NCS Pearson, Inc. (EE. UU.).

**Pearson** es una marca registrada en EE. UU. y/u otros países por Pearson Education, Inc. o afiliados. **MCM** y **Millon** son marcas registradas por DICANDRIEN, Inc.

Este informe contiene información protegida por la legislación sobre los derechos de la propiedad intelectual e industrial. El titular de la licencia puede utilizar fragmentos de este informe de resultados. Este permiso está restringido al mínimo texto necesario para describir con exactitud las conclusiones relevantes y, si procede, a su inclusión en la evaluación escrita del examinando de acuerdo con las normas de citación de la profesión. No está permitido realizar adaptaciones, traducciones, modificaciones ni versiones de este informe sin previa autorización escrita de Pearson.

[ 1.0 / RE1 / QG1 ]

## ASPECTOS DE INTERPRETACIÓN

El MCMI-IV se ha diseñado para evaluar a adultos que buscan atención o tratamiento psicológico. No es, por tanto, un instrumento de evaluación de la personalidad general para población no clínica. Por ello, solo debe utilizarse el MCMI-IV con poblaciones que no difieran notablemente de los sujetos de la muestra en la que se basan los baremos (p. ej., no es apropiado para adolescentes o poblaciones no clínicas). El informe del MCMI-IV no puede interpretarse de forma aislada y debe integrarse con otras fuentes de información. La interpretación del MCMI-IV la debe llevar a cabo un profesional de la salud mental con experiencia en evaluación psicológica.

El paciente es un hombre de 53 años de edad divorciado y con estudios secundarios completados. Actualmente el paciente recibe atención de forma ambulatoria. En cuanto al cuestionario demográfico, el paciente ha identificado problemas relacionados con el consumo de alcohol y los cambios de humor. La información facilitada por el examinador indica que el episodio más reciente ha durado entre tres meses y un año.

Excepto si el paciente es un adulto con un funcionamiento socioemocional relativamente bueno, que está expuesto a leves factores vitales estresantes, las respuestas pueden sugerir una tendencia a presentarse de un modo socialmente favorable debido a la necesidad de aprobación por parte de los demás; o bien poca capacidad de autoanálisis y escaso autoconocimiento. La interpretación de este perfil debe realizarse teniendo en cuenta estas características.

Debido a las puntuaciones elevadas de la escala A (Ansiedad generalizada), se han realizado ajustes en las puntuaciones de las escalas 2B (Melancólico), 8B (Masoquista), C (Límite), 2A (Evitativo) y S (Esquizotípico).

## INVENTARIO CLÍNICO MULTIAIXIAL DE MILLON-IV

### RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES Y PERFIL

CÓDIGO DE PUNTUACIONES MÁXIMAS =6A 4B 4A

AJUSTES DE LAS TASAS BASE = A/CC

INVALIDEZ (V) = 0

INCONSISTENCIA (W) = 7

VALIDEZ	Puntuación			Perfil de las tasas base			
	PD	TB		0	35	75	100
<b>Índices modificadores</b>				<b>Bajo</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	
Sinceridad	X	37	45				
Deseabilidad social	Y	18	78				
Devaluación	Z	4	37				

PERSONALIDAD	Puntuación				Perfil de las tasas base				
	PD	PC	TB		0	60	75	85	115
<b>Patrones clínicos de la personalidad</b>					<b>Estilo Tipo Trastorno</b>				
Esquizoide	1	6	31	40					
Evitativo	2A	3	10	17					
Melancólico	2B	2	9	9					
Dependiente	3	9	44	54					
Histriónico	4A	13	72	70					
Tempestuoso	4B	20	87	74					
Narcisista	5	4	43	48					
Antisocial	6A	11	92	78					
Sádico	6B	4	37	40					
Compulsivo	7	17	59	64					
Negativista	8A	4	24	27					
Masoquista	8B	1	6	7					
<b>Patología grave de la personalidad</b>									
Esquizotípico	S	8	39	47					
Límite	C	4	24	29					
Paranoide	P	4	36	34					

PSICOPATOLOGÍA	Puntuación				Perfil de las tasas base				
	PD	PC	TB		0	60	75	85	115
<b>Síndromes clínicos</b>					<b>Presente Prominente</b>				
Ansiedad generalizada	A	9	57	75					
Síntomas somáticos	H	2	28	20					
Espectro bipolar	N	11	84	75					
Depresión persistente	D	5	24	25					
Consumo de alcohol	B	9	98	102					
Consumo de drogas	T	12	92	85					
Estrés postraumático	R	11	77	71					
<b>Síndromes clínicos graves</b>									
Espectro esquizofrénico	SS	7	39	47					
Depresión mayor	CC	0	13	0					
Delirante	PP	2	51	60					

## INVENTARIO CLÍNICO MULTIAIXIAL DE MILLON-IV FACETAS DE GROSSMAN CON LA PUNTUACIÓN MÁS ALTA

FACETAS DE GROSSMAN	Puntuación			Perfil de las tasas base			
	PD	PC	TB	0	35	75	100
<b>Antisocial</b> <span style="float: right;">6A</span>				Interpretable			
Interpers. irresponsable	6A.1	2	65	65			
Autoimagen autónoma	6A.2	4	86	70			
Dinámicas de irreflexión (paso al acto)	6A.3	6	93	80			
<b>Tempestuoso</b> <span style="float: right;">4B</span>							
Expresivamente impetuoso	4B.1	7	90	75			
Interpers. eufórico	4B.2	6	86	75			
Autoimagen sobreestimada	4B.3	5	69	68			
<b>Histriónico</b> <span style="float: right;">4A</span>							
Expresivamente dramático	4A.1	1	54	60			
Interpers. buscador de atención	4A.2	7	80	75			
Temperamentalmente inconstante	4A.3	10	90	85			

### PUNTUACIONES DE LAS FACETAS DE GROSSMAN

	PD	PC	TB		PD	PC	TB
<b>1 Esquizoide</b>				<b>6B Sádico</b>			
1.1 Interpers. desvinculado	1	22	20	6B.1 Expresivamente precipitado	4	70	64
1.2 Contenido escaso	2	20	30	6B.2 Interpers. desagradable	0	22	0
1.3 Temperamentalmente apático	2	40	40	6B.3 Arquitectura eruptiva	1	47	60
<b>2A Evitativo</b>				<b>7 Compulsivo</b>			
2A.1 Interpers. aversivo	2	24	30	7.1 Expresivamente disciplinado	8	99	100
2A.2 Autoimagen alienada	1	20	15	7.2 Cognitivamente constreñido	6	49	51
2A.3 Contenido vejatorio	2	40	40	7.3 Autoimagen responsable	4	11	34
<b>2B Melancólico</b>				<b>8A Negativista</b>			
2B.1 Cognitivamente fatalista	3	28	30	8A.1 Expresivamente resentido	1	28	20
2B.2 Autoimagen inútil	0	24	0	8A.2 Autoimagen descontenta	3	36	45
2B.3 Temperamentalmente afligido	0	21	0	8A.3 Temperamentalmente irritable	1	32	20
<b>3 Dependiente</b>				<b>8B Masoquista</b>			
3.1 Expresivamente pueril	2	23	24	8B.1 Autoimagen desmerecedora	2	32	30
3.2 Interpers. sumiso	3	61	60	8B.2 Arquitectura invertida	1	25	20
3.3 Autoimagen inepta	1	22	15	8B.3 Temperamentalmente disfórico	2	23	24
<b>4A Histriónico</b>				<b>S Esquizotípico</b>			
4A.1 Expresivamente dramático	1	54	60	S.1 Cognitivamente circunstancial	6	66	70
4A.2 Interpers. buscador de atención	7	80	75	S.2 Autoimagen disociada	0	12	0
4A.3 Temperamentalmente inconstante	10	90	85	S.3 Contenido caótico	1	32	30
<b>4B Tempestuoso</b>				<b>C Límite</b>			
4B.1 Expresivamente impetuoso	7	90	75	C.1 Autoimagen inestable	1	35	20
4B.2 Interpers. eufórico	6	86	75	C.2 Arquitectura disgregada	2	38	40
4B.3 Autoimagen sobreestimada	5	69	68	C.3 Temperamentalmente lábil	1	31	20
<b>5 Narcisista</b>				<b>P Paranoide</b>			
5.1 Interpers. explotador	2	64	65	P.1 Expresivamente defensivo	1	28	20
5.2 Cognitivamente expansivo	7	78	71	P.2 Cognitivamente desconfiado	2	50	60
5.3 Autoimagen admirable	2	69	65	P.3 Dinámicas de proyección	0	20	0
<b>6A Antisocial</b>							
6A.1 Interpers. irresponsable	2	65	65				
6A.2 Autoimagen autónoma	4	86	70				
6A.3 Dinámicas de irreflexión (paso al acto)	6	93	80				

## RESPUESTAS SIGNIFICATIVAS

El paciente ha respondido a los siguientes ítems en el sentido indicado entre paréntesis. Estos ítems pertenecen a categorías específicas y sugieren problemas que el profesional puede analizar en mayor profundidad.

### Preocupación por su salud

- 7. Contenido del ítem omitido

### Alienación interpersonal

- 4. Contenido del ítem omitido

### Falta de control emocional

- 27. Contenido del ítem omitido
- 36. Contenido del ítem omitido
- 45. Contenido del ítem omitido
- 56. Contenido del ítem omitido
- 177. Contenido del ítem omitido

### Potencial conducta autodestructiva

- 14. Contenido del ítem omitido
- 34. Contenido del ítem omitido

### Lesión cerebral

- 55. Contenido del ítem omitido

### Explosiones de ira

- 11. Contenido del ítem omitido
- 191. Contenido del ítem omitido

### Conductas/tendencias autolesivas

- 40. Contenido del ítem omitido

### TDAH

- 56. Contenido del ítem omitido
- 92. Contenido del ítem omitido

### Espectro autista

- 92. Contenido del ítem omitido
- 163. Contenido del ítem omitido
- 179. Contenido del ítem omitido

Fin del informe.



Los informes reales incluyen el contenido de los ítems. Para proteger el uso adecuado del test, el contenido de los ítems no aparece en este informe de ejemplo.

## RESPUESTAS A LOS ÍTEMS

1: 2	2: 1	3: 2	4: 1	5: 2	6: 1	7: 1	8: 2	9: 2	10: 2
11: 1	12: 2	13: 2	14: 1	15: 1	16: 2	17: 2	18: 2	19: 2	20: 1
21: 2	22: 2	23: 2	24: 2	25: 1	26: 2	27: 1	28: 2	29: 2	30: 2
31: 2	32: 2	33: 2	34: 1	35: 1	36: 1	37: 2	38: 2	39: 2	40: 1
41: 2	42: 2	43: 2	44: 1	45: 1	46: 1	47: 2	48: 1	49: 2	50: 2
51: 1	52: 1	53: 1	54: 2	55: 1	56: 1	57: 2	58: 2	59: 2	60: 2
61: 1	62: 1	63: 1	64: 2	65: 2	66: 2	67: 2	68: 2	69: 2	70: 2
71: 2	72: 2	73: 2	74: 2	75: 1	76: 1	77: 2	78: 2	79: 2	80: 2
81: 1	82: 2	83: 1	84: 1	85: 2	86: 2	87: 1	88: 2	89: 1	90: 2
91: 1	92: 1	93: 2	94: 1	95: 2	96: 2	97: 2	98: 2	99: 2	100: 2
101: 2	102: 2	103: 2	104: 2	105: 1	106: 2	107: 2	108: 2	109: 2	110: 2
111: 2	112: 2	113: 2	114: 2	115: 2	116: 2	117: 2	118: 2	119: 2	120: 2
121: 1	122: 2	123: 1	124: 2	125: 1	126: 2	127: 2	128: 1	129: 1	130: 1
131: 2	132: 2	133: 2	134: 1	135: 2	136: 2	137: 1	138: 2	139: 2	140: 2
141: 2	142: 2	143: 1	144: 1	145: 2	146: 2	147: 2	148: 2	149: 2	150: 2
151: 2	152: 1	153: 2	154: 1	155: 1	156: 2	157: 2	158: 1	159: 2	160: 2
161: 2	162: 1	163: 1	164: 2	165: 2	166: 2	167: 2	168: 2	169: 2	170: 2
171: 2	172: 1	173: 1	174: 1	175: 2	176: 2	177: 1	178: 2	179: 1	180: 2
181: 2	182: 2	183: 1	184: 2	185: 1	186: 2	187: 2	188: 1	189: 2	190: 2
191: 1	192: 2	193: 2	194: 1	195: 2					